

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Ровабио® Эксель AP
для улучшения переваримости зерновых кормов
у сельскохозяйственной птицы и свиней

(организация-производитель: фирма «Adisseo France S.A.S.»/
«Адиссео Франс S.A.S.», Франция)

I. Общие сведения

1. Ровабио® Эксель AP (Rovabio® Excel AP) добавка кормовая для улучшения переваримости зерновых кормов у сельскохозяйственной птицы и свиней.

2. Ровабио® Эксель AP – мультиферментный комплекс, продуцируемый штаммом *Penicilium funiculosum*, в состав которого входят ферменты: эндо-1,4-β-ксилаза с активностью не менее 22 000 visko ед/г, эндо-1,3(4)-β-глюканаза с активностью не менее 2 000 AGL ед/г, а также носитель – пшеничная мука (до 100 %).

Добавка кормовая Ровабио® Эксель AP не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации и ЕС.

3. Представляет собой порошок бежевого цвета, не растворимый в воде.

4. Добавку выпускают расфасованной по 25 кг в картонные коробки или бумажные мешки с полиэтиленовой прослойкой.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения кормовой добавки, состава и гарантируемых показателей, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, массы нетто, информации о соответствии, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке изготовителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре не выше 30°C.

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Добавка кормовая Ровабио® Эксель AP не должна применяться по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Ферменты, входящие в состав Ровабио® Эксель AP, гидролизуют некрахмалистые полисахариды зерновых растений.

6. Введение кормовой добавки в рационы свиней и птицы, способствует повышению питательной ценности кормов, содержащих различные типы зерновых (пшеница, тритикале, рожь, ячмень, кукуруза и др.) и шрота масличных культур (соевый, подсолнечный, каноловый и др.), снижению вязкости содержимого кишечника; уменьшению накопления аммиака в производственных помещениях.

III. Порядок применения

7. Добавку кормовую Ровабио® Эксель АР применяют для улучшения переваримости зерновых кормов у сельскохозяйственной птицы и свиней.

8. Кормовую добавку вводят в премиксы на премиксных заводах, в соответствии с существующей технологией смешивания.

Норма ввода кормовой добавки составляет: 50 г/т комбикорма или 5 кг/т 1%-премикса. Корма с введенной кормовой добавкой не рекомендуется нагревать свыше 85°C.

9. Добавка кормовая совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

10. При использовании кормовой добавки Ровабио® Эксель АР побочных явлений и осложнений не выявлено.

11. Продукцию от сельскохозяйственных животных, в т.ч. птицы, после применения Ровабио® Эксель АР, можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

13. При попадании кормовой добавки на кожу, её следует смыть водой с мылом; на слизистые оболочки и в глаза - немедленно промыть их большим количеством проточной воды.

14. Ровабио® Эксель АР следует хранить в местах недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «Adisseo France S.A.S.» (Франция) совместно с ООО «Адиссео Евразия» (г. Москва).

(Адрес организации-производителя: Immeuble Antony Parc II 10, place du General de Gaulle 92160 Antony, France)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция, утвержденная 26 ноября 2007 года.

Регистрационный номер ПВИ-2-0.2/01102